

# Su BRAFTOVI™ (encorafenib)/ MEKTOVI® (binimetinib) PLAN DE ACCIÓN

(para rellenar por su equipo de oncología)

Nombre del paciente \_\_\_\_\_ Fecha Actual \_\_\_\_\_  
*Nombre completo* *Este Día*

Efectos secundarios discutidos \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Puntos clave/importantes \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### CÓMO TOMAR SU MEDICACIÓN Y QUÉ HACER SI USTED SE OLVIDA UNA DOSIS:

- BRAFTOVI se toma por boca una vez al día. Tu dosis es \_\_\_\_\_ capsula cada \_\_\_\_\_ horas/día
- MEKTOVI se toma también por boca, dos veces al día. Tu dosis es \_\_\_\_\_ tabletas cada \_\_\_\_\_ horas
- Ambas medicaciones pueden ser tomadas con comida o en ayunas
- No se necesita conservar en frío
- La dosis de la medicación puede reducirse por indicación médica a causa de presentar efectos secundarios u otros problemas
- Evite tomar pomelo o zumo de pomelo durante el tratamiento con BRAFTOVI, ya que puede afectar a la correcta absorción de BRAFTOVI y puede potenciar los efectos secundarios.

### QUÉ HACER SI SE PIERDE UNA DOSIS:

- Si has olvidado tomar la dosis de BRAFTOVI y hay menos de 12 horas de margen con respecto a la siguiente dosis, NO TOMES la dosis olvidada. Si hay más de 12h a la siguiente dosis, entonces si debe tomarla
- Si has olvidado tomar la dosis de MEKTOVI y han pasado más de 6 horas a la siguiente dosis, NO TOMES la dosis olvidada. Si hay 6 horas o más a la siguiente dosis, entonces tome la dosis olvidada
- Si vomita durante la toma de MEKTOVI o BRAFTOVI, no tome una dosis extra. Espere a tomar la siguiente dosis en el horario habitual.

**Formas que pueden ayudarle a recordar tomar sus pastillas:** Puede usar el calendario que le adjuntamos, anotando cada dosis que toma. Puede utilizar también la alarma del reloj del móvil de recordatorio, utilizar recordatorios en espejos, puertas o en tu propio ordenador. Utiliza la forma que mejor se ajuste a ti

Asegúrese de llevar su calendario a las visitas con su equipo de oncología.

**Si usted o su pareja quedan embarazadas:** Informe a su equipo de oncología de inmediato si usted o su pareja quedan embarazadas o si creen que están embarazadas mientras toman estos medicamentos, ya que pueden dañar al feto en desarrollo. Asegúrese de usar un método anticonceptivo eficaz si es una mujer en edad fértil o un hombre sexualmente activo. BRAFTOVI puede causar problemas de fertilidad en los hombres, así que hable con su proveedor de atención médica de esta preocupación.

**Efectos secundarios comunes de esta terapia combinada:** Incluso los efectos secundarios menores pueden ser graves y debe informar de TODOS ellos a la consulta de Oncología. Los efectos secundarios más comunes de tomar BRAFTOVI/MEKTOVI son...

- Fatiga
- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Dolor abdominal
- Dolores o hinchazón en las articulaciones (edema)

# TOMANDO LA MEDICACIÓN

**BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib)**  
*Combinación para Melanoma*

## SIGNOS DE UNA REACCIÓN ALÉRGICA A LOS MEDICAMENTOS:

Deje de tomar sus medicamentos y obtenga ayuda médica de inmediato si tiene alguno de estos signos de una reacción alérgica grave:

- Rash o enrojecimiento por todo el cuerpo
- Dificultad respiratoria o al tragar
- Hinchazón en la cara, labios o lengua
- Opresión en la garganta o voz ronca
- Sensación de desmayo
- Elevación del ritmo cardíaco (taquicardia)

Quizás quieras llevar un diario o anotaciones de cuando toma las pastillas, cuántas pastillas toma y si presenta algún efecto secundario.

Asegúrese de llevar este diario de tratamiento a sus visitas con su equipo de oncología.

## EFFECTOS SECUNDARIOS IMPORTANTES:

Su equipo de oncología puede analizar algunos efectos secundarios de BRAFTOVI/MEKTOVI que pueden provocar problemas graves si no se atienden de inmediato. Estas secciones brindan información sobre los posibles síntomas, lo que debe decirle a su equipo de oncología, cuándo debe obtener ayuda médica de inmediato y los pasos que puede seguir para ayudar a aliviar los síntomas.



# CAMBIOS EN LA PIEL

## BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib)

Combinación para Melanoma

*Para reportar inmediatamente a tu médico*

### ¿Cuáles son los síntomas?:

- Protuberancias rojizas que sangran o no curan
- Cambios en el tamaño o color de los lunares
- Engrosamiento de la piel (como callos)
- Picor
- Rash
- Nuevas verrugas
- Dolor en la piel

### Qué debes comunicar a tu equipo médico:

- Cuándo has notado estos cambios en la piel o el picor
- Cómo es el “rash” que presentas – (eg, plano, abultado, tipo acne, etc.)
- Dónde y cuánto de tu cuerpo cubre el rash
- Si los cambios en la piel te dificulta ponerte ropa, comer o dormir
- Si tienes o has tenido algún problema previo en la piel y si ha empeorado
- Estas utilizando algún jabón nuevo o si has estado en contacto con algún producto químico nuevo o si has estado en contacto con animales recientemente
- Si presentas algún dolor o molestia nueva en la piel, nuevas verrugas, lesiones abultadas que sangran o no curan bien, o algún lunar que ha cambiado
- Si has empezado con alguna nueva medicación
- Si has probado alguna cosa nueva para aliviar o reducir los síntomas.

### Banderas rojas:

**Llame a la consulta de su oncólogo de inmediato; si no están disponibles, vaya directamente al servicio de urgencias.**

- Si tiene un rash que cubre una zona extensa de tu cuerpo o que empeora rápidamente
- Si presentas alguna llaga ( en tu piel o en tu boca) que se están pelando. Si la piel parece estar infectada (heridas, pus, o supura)
- Si el rash va acompañado de fiebre (tal y como se define en la consulta)

### Manejo de los efectos secundarios:

- Evita el jabón. Utiliza, de forma moderada, limpiadores no jabonosos como por ejemplo Cetaphil®, Eucerin®, and NutriBiotic®
- Evita los baños y duchas calientes; usa agua templada para bañarse
- Evita la ropa y zapatos muy ajustados
- Manten tus uñas cortas para evitar lesionarte la piel al rascarte
- Aplicate crema hidratante diariamente
- Proteje tu piel aplicandote protección solar (30 SPF or superior), sombrero, ropa de protección UV y gafas de sol. No te olvides de aplicar en cara y manos
- Tu equipo médico puede decirte de tomar algún antihistaminico o calmante para reducir el dolor y el picor
- Haz exámenes regulares de la piel antes de empezar el tratamiento, cada 2 meses durante el tratamiento y hasta los 6 meses de haber terminado/finalizado el tratamiento
- Si tomas algún otro medicamento durante el tratamiento, por favor notificalo a tu equipo médico.



# PROBLEMAS EN LA VISION O EN LOS OJOS

**BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib)**

Combinacion para Melanoma

*Para reportar inmediatamente a tu médico*

## ¿ Cuáles son los síntomas?:

- Dolor en el ojo, inflamación o enrojecimiento
- Vision borrosa
- Ver puntos de colores
- Perdida total o parcial de la visión
- Ver halos u otros problemas visuales
- Vision doble
- Sensibilidad a la luz

## Qué debes comunicar a tu equipo médico:

- Cuando han empezado los problemas visuales, como de severos son y cuanto duran
- Si has tenido algún problema visual previo, como ojos secos o glaucoma y si estos síntoma han empeorado
- Si has tenido alguna lesion en el ojo reciente, si has iniciado alguna medicación nueva, o has estado expuesto a quimicos
- Si utilizas lentes de contacto
- Si tienes diabetes
- Si tienes algún otro síntoma como dolor de cabeza, vomito o nauseas.
- Cuando ha sido tu última revisión ocular

## Banderas rojas:

**Llame a la consulta de su oncólogo de inmediato; si no están disponibles, vaya directamente al servicio de urgencias.**

- Si tienes sintomas severos y repentinos/subitos, como cambios en la vision, dolor en el ojo enrojecimiento o inusual sensibilidad a la luz del sol, deslumbramiento o problemas para fijar la mirada
- Inabilidad de rehalizar actividades de la vida diaria debido a los problemas oculares
- Perdida gradual o repentina de vision

## Manejo de los efectos secundarios:

- Sigue las instrucciones de tu equipo médico para obtener exámenes visuales con el oftalmólogo
- Lleva gafas de sol para proteger tus ojos del sol y de los rayos UV
- Si llevas lentes de contacto, sigue con cuidado las guias y manten tus ojos bien hidratados y limpios y humedos y ves sustituyendo las lentes segun las recomendaciones
- Si tienes diabetes, manten los niveles de glucosa bajo un buen control para reducir el riesgo enfermedad/afectacion ocular
- Sigue un estilo de vida sano y cuida de tus ojos al igual que de tu cuerpo
- Si tomas algún otro medicamento durante el tratamiento, por favor comunicalo a tu equipo médico.



# PROBLEMAS CARDIACOS

**BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib)**

Combinacion para Melanoma

*Para reportar inmediatamente a tu médico*

## ¿ Cuáles son los síntomas?:

- Sensación de que tu corazón se salta un latido, fluttering (se acelera), o late con mucha fuerza o muy rapido
- Cambios en el nivel de energia
- Sensación de “falta de aliento” o andar corto de respiracion cuando estas en reposo o durante la actividad
- Un cambio que no estaba previamente, tos o sibilancia (hacer un silbido durante la respiracion)
- Exceso de sudoracion
- Hinchazón en brazos o piernas ( incluidos los tobillos)
- Mareo
- Desmayos
- Dolor en el pecho

## Qué debes comunicar a tu equipo médico:

- Cuando han empezado los problemas, como de severos son y cuanto duran
- Si ya tenias alguno de estos sintomas antes de empezar el tratamiento con BRAFTOVI/ MEKTOVI y si han empeorado
- Si se te ha comunicado en el pasado padecer de alguna patologia cardiaca previa
- Que hace que los sintomas empeoren o mejoren
- Si se te ha prescrito recientemente alguna otra medicacion o medicamentos de venta sin receta
- Si has recibido radiacion previamente

## Banderas rojas:

**Llame a la consulta de su oncólogo de inmediato; si no están disponibles, vaya directamente al servicio de urgencias.**

- Si usted presenta estos sintomas de forma repentina.
- Algun tipo de dolor en el pecho
- Dificultad respiratoria
- Desmayos
- Incapacidad de realizar actividades tipicas de la vida diaria a causa de los sintomas

## Manejo de los efectos secundarios:

- Sigue las indicaciones de tu equipo medico para revisiones cardiologicas
- Asegurate de beber suficientes liquidos para estar bien hidratado
- Evita beber alcohol o tomar drogas que afecten a tu corazón o tu cerebro (como marihuana, pastillas para dormir o estimulantes) a no ser/ a menos que te lo haya indicado/prescrito tu equipo médico
- Sigue un estilo de vida saludable y cuida de tu corazón tan bien como a tu cuerpo
- Si tomas cualquier otra medicacion para la presion arterial o tu ritmo cardiaco, asegurate de tomarlas segun estan indicadas y no dejes de tomar ninguna dosis
- Si tomas algún otro medicamento durante el tratamiento, por favor notificalo a tu equipo medico.



# DOLOR ARTICULAR, INFLAMACIÓN O RIGIDEZ

**BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib)**

Combinación para Melanoma

*Para reportar inmediatamente a tu médico*

## ¿Cuáles son los síntomas?:

- Dolor articular
- Rigidez articular
- Edema articular
- Dificultad al caminar o realizar las actividades de la vida diaria
- Enrojecimiento alrededor de las articulaciones

## Qué debes comunicar a tu equipo médico:

- Cuando han empezado los problemas, como de severos son y cuanto duran
- Que articulaciones se ven afectadas
- Si has tenido problemas similares previos y si los síntomas han empeorado
- Si has probado algo en casa para aliviar los síntomas

## Banderas rojas:

**Llame a la consulta de su oncólogo de inmediato; si no están disponibles, vaya directamente al servicio de urgencias.**

- Si tiene un inicio repentino o intenso de dolor, hinchazón o rigidez en las articulaciones
- Si la articulación parece deformada
- Si no puede colocar peso sobre la articulación (como el tobillo) o usarla en absoluto

## Manejo de los efectos secundarios:

- Pregunte a su equipo de oncología sobre el uso de antiinflamatorios/analgésicos como aspirina, ibuprofeno o naproxeno para aliviar el dolor y la rigidez. Pregúntales las dosis
- Aplicar una bolsa de hielo en las articulaciones inflamadas durante 15 minutos varias veces al día
- Mantenga la articulación por encima de su corazón siempre que pueda para reducir la hinchazón
- Utilice una envoltura elástica o cinta adhesiva en la articulación para sostenerla
- Evite las actividades que causen dolor, pero trate de mantener una rutina de ejercicios, si es posible
- Si le recetan algún medicamento durante el tratamiento, informe a su equipo de oncología.



# OTROS SINTOMAS A TENER EN CUENTA

A continuación se presentan otros síntomas que puede tener cuando toma BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib). Preste mucha atención a los síntomas marcados con una marca. Llame a la oficina si desarrolla alguno de estos síntomas y considere ir directamente a la sala de emergencias si tiene alguno de los síntomas de bandera roja.

✓	Síntomas	Banderas rojas (signos de que algo grave puede estar pasando que necesita atención inmediata)
	Cambios en el movimiento intestinal o estreñimiento (infecciones intestinales poco frecuentes movimientos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si sus heces son negras o rojas y tiene dolor y fiebre (como lo define el consultorio de su oncólogo)</li> </ul>
	Diarrea (heces sueltas o frecuentes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor severo en el estómago; heces con sangre o que parecen alquitrán</li> </ul>
	Mareos (aturdimiento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se desmaya</li> </ul>
	Fatiga (sentirse débil o cansado)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se desmaya o está demasiado débil para levantarse de la cama</li> </ul>
	Fiebre (alta temperatura más o menos escalofríos y fatiga)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si su temperatura supera los 40,0 °C o tiene cualquier temperatura superior a los 38,5 °C y tiene escalofríos intensos, se desmaya o tiene problemas para orinar</li> </ul>
	Dolores de cabeza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si tiene un dolor de cabeza muy doloroso (el “peor dolor de cabeza de su vida”), dolor de cabeza que no desaparece después de unas horas o dolor de cabeza con fiebre, dolor o rigidez en el cuello y/o sarpullido</li> </ul>
	Dolores musculares, dolores, espasmos o debilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si estos síntomas ocurren junto con orina oscura y rojiza</li> </ul>
	Náuseas (sensación de que va a vomitar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si tiene náuseas incontrolables que le impiden comer y/o beber</li> </ul>
	Problemas nerviosos en la cara (babeo, dificultad para sonreír o la boca parece “caída”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si tiene alguna dificultad para hablar o tiene otras áreas de su cuerpo que se debilitan o que no puede mover</li> </ul>
	Reacciones al sol (quemaduras solares; piel enrojecida, dolorosa, seca y con picazón que está caliente al tacto; sarpullido solar; irritación de la piel; bultos; piel engrosada, seca y arrugada)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si tiene enrojecimiento en todo el cuerpo, ampollas en la piel o en la boca y/o la piel se le pela</li> </ul>



OTROS SÍNTOMAS A TENER EN CUENTA (Continuación)

✓	Síntomas	Banderas rojas (signos de que algo grave puede estar pasando que necesita atención inmediata)
	Dificultad para respirar / Corto de aire (dificultad para respirar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si tiene algún problema para recuperar el aliento en reposo</li> <li>• Si tiene dificultad para respirar y dolor en el pecho y/o desmayo</li> </ul>
	Inflamación de la piel (hinchazón) en áreas tratadas con radiación	—
	Dolor de estómago	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si tiene dolor o sensibilidad repentinos en el estómago, sangre en las heces, está vomitando sangre y/o su piel u ojos se están poniendo amarillos</li> </ul>
	Hinchazón en sus brazos o piernas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si tiene un punto cálido y sensible en la pierna que no se enfría cuando le pone hielo, y/o si el lugar le pica o siente un hormigueo, y/o el dolor empeora sin razón alguna</li> </ul>
	Orina, oscura o rojiza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si tiene sangre roja brillante en la orina o si al mismo tiempo también se siente mareado o tiene dolor en la espalda o en el costado, sabor metálico en la boca, malestar estomacal, vómitos, mucho cansancio, tiene dificultad para respirar y/o hinchazón de brazos, piernas o cara</li> </ul>
	Micción, menos de lo habitual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si también tiene sangre en la orina, hinchazón de los tobillos y no tiene ganas de comer</li> </ul>
	Micción, más de lo habitual	—
	Sangrado vaginal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si sus períodos son más abundantes de lo normal, está sangrando entre períodos o tiene algún sangrado posmenopáusico</li> </ul>
	Vómitos (vomitar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si no puede comer ni beber durante más de 8 horas y/o vomita sangre o tiene dolor de estómago intenso</li> </ul>
	Vómitos (vomitar) sangre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vomita sangre</li> </ul>

# RECURSOS

**AIM Melanoma Foundation**

(enfermera de guardia, simposios para pacientes, recursos sobre medicamentos, etc.):

[AIMatMelanoma.org](http://AIMatMelanoma.org)

Melanoma España

<http://www.melanomaespana.es/>

# Su calendario de dosificación de Braftovi™ (encorafenib)/ Mektovi® (binimetinib)

FECHA DE INICIO: \_\_\_\_\_

	_____ día	_____ día	_____ día	_____ día	_____ día	_____ día	_____ día	_____ día	_____ día
	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
SEMANA 1	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)
	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)
	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)
SEMANA 2	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)
	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)
	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)
SEMANA 3	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)
	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)
	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)
SEMANA 4	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)
	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)	<input type="checkbox"/> MEKTOVI (bini)
	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)	<input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco)

bini = binimetinib; enco = encorafenib

Para una dosis olvidada de Mektovi (binimetinib): No tome una dosis olvidada si es dentro de las 6 horas de la próxima dosis. En su lugar, espere y tome la dosis a la hora habitual. Para una dosis olvidada de Braftovi (encorafenib): No tome una dosis olvidada si es dentro de las 12 horas posteriores a la próxima dosis. En su lugar, espere y tome la dosis a la hora habitual.

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.  
No tome una dosis adicional de Braftovi (encorafenib) o Mektovi (binimetinib) si vomita después de tomar su dosis programada.

Para obtener más información sobre recetas y síntomas en Braftovi (encorafenib): [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/braftovi-epar-product-information\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/braftovi-epar-product-information_en.pdf)

Para obtener más información sobre recetas y síntomas en Mektovi (binimetinib): [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/mektovi-epar-product-information\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/mektovi-epar-product-information_en.pdf)