

IHR TAFINLAR® (dabrafenib)/MEKINIST® (trametinib) AKTIONSPLAN

(Wird von einem Mitglied Ihres Onkologieteams ausgefüllt)

Patientenname _____ Datum _____
Vollständiger Name *Heutiges Datum*

Nebenwirkungen besprochen _____

Wichtige Punkte _____

WIE SIE IHRE MEDIKAMENTE EINNEHMEN:

- Tafinlar wird zweimal täglich im Abstand von etwa 12 Stunden oral eingenommen. Ihre Dosis ist _____
- Mekinist wird auch oral eingenommen, jedoch nur einmal täglich. Ihre Dosis ist _____
- Mekinist sollte jeden Tag zur gleichen Zeit eingenommen werden, vorzugsweise mit beidem die morgendliche oder abendliche Dosis von Tafinlar
- Beide Medikamente sollen mindestens 1 Stunde vor einer Mahlzeit oder 2 Stunden nach einer Mahlzeit eingenommen werden
- Mekinist muss in einem Kühlschrank (oder einem gekühlten Lunchpaket, falls vorhanden) aufbewahrt werden auf Reisen in der Originalflasche mit fest verschlossenem Deckel zum Schutz das Medikament vor Hitze, Licht und Feuchtigkeit. Fragen Sie in der Praxis Ihres Onkologen nach was zu tun ist, wenn Sie vergessen haben, Mekinist kalt zu halten.

WAS TUN, WENN SIE EINE DOSIS VERPASSEN:

- Wenn Sie die Einnahme Ihrer Tafinlar-Dosis vergessen haben und es weniger als 6 Stunden bis zur nächsten Dosis sind, **NEHMEN** Sie die vergessenen Pillen **NICHT EIN**. Wenn es bis zur nächsten Dosis mehr als 6 Stunden dauert, nehmen Sie die Dosis ein
- Wenn Sie die Einnahme Ihrer Mekinist- Dosis vergessen haben und es weniger als 12 Stunden bis zur nächsten Dosis sind, **NEHMEN** Sie die vergessenen Pillen **NICHT EIN**. Wenn es bis zu Ihrer nächsten Dosis mehr als 12 Stunden dauert, nehmen Sie die Dosis ein

Möglichkeiten, die Ihnen helfen können, sich an die Einnahme Ihrer Pillen zu erinnern: Sie können den beigefügten Kalender verwenden und jede Dosis, die Sie einnehmen, abhaken. Sie können auch einen Smartphone-Alarm verwenden oder Erinnerungen an Spiegeln, Türen oder Ihrem Laptop anbringen. Sie können entscheiden, was für Sie am besten funktioniert.

Bringen Sie unbedingt Ihren Kalender zu Ihren Besuchen bei Ihrem Onkologieteam mit.

Wenn Sie oder Ihre Partnerin schwanger werden: Informieren Sie sofort Ihr Onkologieteam, wenn Sie oder Ihre Partnerin schwanger werden oder glauben, schwanger zu sein, während Sie diese Medikamente einnehmen, da sie einem sich entwickelnden Fötus schaden können. Stellen Sie sicher, dass Sie eine wirksame Empfängnisverhütung anwenden, wenn Sie eine Frau im gebärfähigen Alter oder ein sexuell aktiver Mann sind.

Häufige Nebenwirkungen dieser Kombinationstherapie: Selbst geringfügige Nebenwirkungen können schwerwiegend sein und Sie sollten ALLE davon dem Büro Ihres Onkologen melden. Die häufigsten Nebenwirkungen der Einnahme von Tafinlar/Mekinist sind...

- | | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| • Hautausschlag | • Durchfall | Armen, Beine | • Verdickung von die Haut |
| • Fieber | • Erbrechen | • Kopfschmerzen | • Warzen |
| • Schüttelfrost | • Bluthochdruck Druck | • Husten | • Haarausfall |
| • Übelkeit | • Schwellung der Gesicht, | • Gelenkschmerzen | |

ANZEICHEN EINES ALLERGIKERS REAKTION AUF DIE MEDIKAMENTE:

Brechen Sie die Einnahme Ihrer Medikamente ab und suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf, wenn Sie eines dieser Anzeichen einer schweren allergischen Reaktion haben:

- Ausschlag oder Rötung am ganzen Körper
- Schwierigkeiten beim Atmen oder Schlucken
- Schwellung des Gesichts, der Lippen oder der Zunge
- Engegefühl im Hals oder eine heisere Stimme
- Schwächegefühl
- Ein schneller Herzschlag

Sie können ein Notizbuch als Ihr Behandlungstagebuch führen und aufschreiben, wann Sie Ihre Pillen einnehmen, wie viele Pillen Sie einnehmen und ob Sie irgendwelche Nebenwirkungen haben.

Bringen Sie dieses Behandlungstagebuch unbedingt zu Ihren Besuchen bei Ihrem Onkologieteam mit.



WICHTIGE NEBENWIRKUNGEN:

Ihr Onkologieteam kann einige Nebenwirkungen von Tafinlar/Mekinist besprechen, die zu ernsthaften Problemen führen können, wenn sie nicht sofort behandelt werden. Diese Abschnitte enthalten Informationen über mögliche Symptome, was Sie Ihrem Onkologieteam mitteilen sollten, wann Sie sofort medizinische Hilfe benötigen und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um die Symptome zu lindern.

FIEBER, MIT ODER OHNE SCHÜTTELN

TAFINLAR® (dabrafenib)/MEKINIST® (trametinib)

Kombination für Melanom

Melden Sie sich sofort in der Praxis Ihres Onkologen

Was sind die Symptome?

Temperatur von _____ °C
oder höher oder
Schüttelfrost ohne Fieber

Was Sie Ihrem onkologischen Teammitglied mitteilen sollten:

- Wie hoch Ihre Temperatur ist
- Wann das Fieber begonnen hat und wie lange es gedauert hat
- Mit welchem Thermometer haben Sie ihre Temperatur gemessen?
- Wenn Sie Schüttelfrost, Magen- oder Atemprobleme haben, sich beim schnellen Aufstehen schwindelig fühlen, Sie sich sehr müde fühlen und/oder nicht so oft wie gewöhnlich auf die Toilette gegangen sind (Urinieren).
- Wie viel und was Sie in den letzten 24 Stunden getrunken haben
- Wenn Sie in letzter Zeit mit Menschen mit Erkältung, einer Grippe oder Tieren zusammen waren oder wenn Sie national oder international gereist sind

Rote Flaggen:

- Fieber über 40°C
- Jegliches Fieber und Bewusstlosigkeit oder Ohnmachtsgefühl

Rufen Sie sofort die Praxis Ihres Onkologen an. Wenn niemand erreichbar ist, gehen Sie direkt in die Notaufnahme



Umgang mit Ihren Nebenwirkungen:

- Wenn dies von Ihrem Onkologen genehmigt wurde, nehmen Sie alle 6 Stunden rezeptfreie Schmerzmittel wie Paracetamol oder Ibuprofen ein, bis das Fieber verschwindet. Nehmen Sie nicht mehr als 3000 mg Paracetamol oder 2400 mg Ibuprofen pro Tag ein
- Nehmen Sie ein kühles oder leicht warmes Bad
- Legen Sie kühle Kompressen oder eine Kältepackung auf Stirn und Nacken
- Trinken Sie Wasser und andere Flüssigkeiten wie Saft oder Sportgetränke (Gatorade®, Powerade® und Pedialyte®) oder lutschen Sie Eis am Stiel, um eine Dehydrierung zu vermeiden

HAUTVERÄNDERUNGEN

TAFINLAR® (dabrafenib)/MEKINIST® (trametinib)

Kombination für Melanom

Melden Sie sich sofort in der Praxis Ihres Onkologen

Was sind die Symptome?

- Rötliche Beulen, die bluten oder nicht heilen
- Veränderungen in der Größe oder Farbe von Muttermalen
- Rötung der Haut, die wie ein Sonnenbrand aussieht
- Juckreiz
- Ein Ausschlag
- Neue Warzen
- Hautwunden

Was Sie Ihrem onkologischen Teammitglied mitteilen sollten:

- Wenn Sie die Hautveränderung oder den Juckreiz zum ersten Mal bemerkt haben
- Wie der „Ausschlag“ aussieht (z. B. flach, uneben, akneartig usw.)
- Wo und wie viel von Ihrem Körper der Ausschlag bedeckt
- Wenn die Hautveränderung es Ihnen schwer macht, sich anzuziehen, zu essen oder zu schlafen
- Wenn Sie in der Vergangenheit Hautprobleme hatten und wenn sich diese Symptome verschlimmert haben
- Wenn Sie in letzter Zeit eine neue Seife verwendet haben oder in der Nähe von neuen Chemikalien oder Tieren waren
- Wenn Sie neue Hautwunden, neue Warzen, rötliche Beulen haben, die bluten/nicht heilen, oder ein Muttermal, das sich verändert hat
- Wenn Sie kürzlich mit der Einnahme neuer Medikamente begonnen haben
- Alles, was Sie zu Hause versucht haben, um die Symptome zu behandeln

Rote Flaggen:

- Ein Ausschlag, der einen großen Teil Ihres Körpers bedeckt oder sich schnell verschlimmert
- Blasen (auf Ihrer Haut oder in Ihrem Mund), die sich ablösen. Haut, die infiziert aussieht (rote Streifen, Eiter oder Ausfluss)
- Jeder Hautausschlag, der von Fieber begleitet wird (wie von Ihrem Onkologen definiert)

Rufen Sie sofort die Praxis Ihres Onkologen an. Wenn niemand erreichbar ist, gehen Sie direkt in die Notaufnahme



Umgang mit Ihren Nebenwirkungen:

- Vermeiden Sie Seife. Verwenden Sie stattdessen sanfte, seifenfreie Reinigungsmittel wie Cetaphil®, Eucerin® und NutriBiotic®
- Vermeiden Sie heiße Bäder; Verwenden Sie zum Baden lauwarmes (warmes) Wasser
- Vermeiden Sie enge Kleidung und Schuhe
- Halten Sie Ihre Fingernägel kurz, um zu verhindern, dass Sie Ihre Haut durch Kratzen verletzen
- Trage täglich eine Feuchtigkeitscreme auf
- Schützen Sie Ihre Haut vor der Sonne, indem Sie Sonnencreme (30 SPF oder höher), einen Hut und UV-schützende Kleidung und Sonnenbrille tragen. Hände und Gesicht nicht vergessen
- Ihr Onkologieteam kann Ihnen sagen, dass Sie ein Antihistaminikum oder Schmerzmittel einnehmen sollen, um die Schmerzen und den Juckreiz zu lindern

AUGEN- UND SICHTPROBLEME

TAFINLAR® (dabrafenib)/MEKINIST® (trametinib)

Kombination für Melanom

Melden Sie sich sofort in der Praxis Ihres Onkologen

Was sind die Symptome?

- Augenschmerzen, Schwellung oder Rötung
- Verschwommene Sicht
- Teilweiser oder vollständiger Sehverlust
- Halos oder andere Sehprobleme sehen

Was Sie Ihrem onkologischen Teammitglied mitteilen sollten:

- Wann Sie begonnen haben, Sehstörungen zu haben, wie schwer sie sind und wie lange sie andauern
- Wenn Sie in der Vergangenheit Sehprobleme hatten, wie z. B. trockene Augen oder Glaukom, und wenn sich diese Symptome verschlimmert haben
- Wenn Sie kürzlich eine Augenverletzung hatten, mit einer neuen Medikation begonnen haben oder Chemikalien ausgesetzt waren
- Wenn Sie Kontaktlinsen tragen
- Wenn Sie Diabetes haben
- Wenn Sie andere Symptome wie Kopfschmerzen, Erbrechen oder Übelkeit haben
- Wann Sie das letzte Mal eine Augenuntersuchung hatten

Rote Flaggen:

- Wenn Sie plötzliche und schwere Symptome haben, wie plötzliche Sehstörungen, Augenschmerzen, Rötung oder ungewöhnliche Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht und Blendung
- Unfähigkeit, aufgrund von Augenproblemen regelmäßige Aktivitäten des täglichen Lebens auszuführen
- Allmählicher oder plötzlicher Sehverlust

Rufen Sie sofort die Praxis Ihres Onkologen an. Wenn niemand erreichbar ist, gehen Sie direkt in die Notaufnahme



Umgang mit Ihren Nebenwirkungen:

- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Onkologieteams für Augenuntersuchungen beim Augenarzt
- Tragen Sie eine Sonnenbrille, um Ihre Augen vor den schädlichen Sonnenstrahlen zu schützen
- Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, achten Sie darauf, die Richtlinien zu befolgen, um Ihre Augen gut mit Feuchtigkeit zu versorgen und die Linsen zu reinigen, zu befeuchten und zu ersetzen
- Wenn Sie Diabetes haben, halten Sie Ihren Blutzuckerspiegel gut unter Kontrolle, um das Risiko von Augenerkrankungen zu verringern
- Befolgen Sie einen gesunden Lebensstil, um sowohl Ihre Augen als auch Ihren Körper zu pflegen
- Wenn Sie während der Behandlung Medikamente einnehmen, benachrichtigen Sie Ihr Onkologieteam

HERZPROBLEME

TAFINLAR® (dabrafenib)/MEKINIST® (trametinib)

Kombination für Melanom

Melden Sie sich sofort in der Praxis Ihres Onkologen

Was sind die Symptome?

- Das Gefühl, dass Ihr Herz einen Schlag aussetzt, flattert oder zu stark oder zu schnell schlägt
- Völlegefühl oder Kurzatmigkeit im Ruhezustand oder bei Aktivität
- Eine Änderung eines bereits bestehenden Hustens oder Keuchens (ein Pfeifgeräusch beim Atmen)
- Schwellungen in den Armen oder Beinen (einschließlich Knöcheln)
- Änderungen des Energieniveaus
- Starkes Schwitzen
- Schwindel
- Ohnmacht
- Brustschmerzen

Was Sie Ihrem onkologischen Teammitglied mitteilen sollten:

- Wann eines dieser Symptome bei Ihnen aufgetreten ist, wie stark es ist und wie lange es anhält
- Wenn Sie eines dieser Symptome hatten, bevor Sie mit der Behandlung mit Tafinlar/Mekinist begonnen haben
- Wenn Ihnen in der Vergangenheit gesagt wurde, dass Sie an einer Herzerkrankung leiden
- Was macht die Symptome schlimmer oder besser
- Wenn Sie kürzlich neue verschriebene oder rezeptfreie Medikamente hinzugefügt haben
- Wenn Sie zuvor eine Bestrahlung hatten

Rote Flaggen:

- Jeder Brustschmerz
- Atembeschwerden
- Ohnmacht
- Sie sind aufgrund Ihrer Symptome nicht in der Lage, Ihre typischen Aktivitäten des täglichen Lebens auszuführen

Rufen Sie sofort die Praxis Ihres Onkologen an. Wenn niemand erreichbar ist, gehen Sie direkt in die Notaufnahme



Umgang mit Ihren Nebenwirkungen:

- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Onkologieteams für Tests an Ihrem Herzen
- Achten Sie darauf, genug Flüssigkeit zu trinken, um hydratisiert zu bleiben
- Vermeiden Sie es, Alkohol zu trinken oder Drogen zu nehmen, die das Herz oder das Gehirn beeinflussen (wie Marihuana, Schlaftabletten oder Stimulanzien), es sei denn, Ihr Arzt hat Sie dazu aufgefordert
- Wenn Sie Medikamente für Ihren Blutdruck oder Ihr Herz einnehmen, achten Sie darauf, diese wie verordnet einzunehmen und keine Dosis auszulassen
- Befolgen Sie einen gesunden Lebensstil, um sowohl Ihr Herz als auch Ihren Körper zu pflegen
- Wenn Sie während der Behandlung Medikamente einnehmen, benachrichtigen Sie Ihr Onkologieteam

GELENKSCHMERZEN, SCHWELLEN ODER STEIFIGKEIT

TAFINLAR® (dabrafenib)/MEKINIST® (trametinib)

Kombination für Melanom

Melden Sie sich sofort in der Praxis Ihres Onkologen

Was sind die Symptome?

- Gelenkschmerzen
- Gelenksteife
- Gelenkschwellung
- Schwierigkeiten beim Gehen oder bei der Durchführung Ihrer täglichen Aktivitäten
- Rötung um ein Gelenk

Was Sie Ihrem onkologischen Teammitglied mitteilen sollten:

- Wann diese Symptome begannen, was sie verursacht und wie lange sie anhielten
- Welche Gelenke sind betroffen
- Wenn Sie in der Vergangenheit jemals Gelenkprobleme hatten

Rote Flaggen:

- Wenn Sie plötzliche oder schwere Gelenkschmerzen, -schwellungen oder -steifheit haben
- Wenn das Gelenk deformiert aussieht
- Wenn Sie das Gelenk (z. B. Ihren Knöchel) nicht belasten oder überhaupt nicht verwenden können

Rufen Sie sofort die Praxis Ihres Onkologen an. Wenn niemand erreichbar ist, gehen Sie direkt in die Notaufnahme

Umgang mit Ihren Nebenwirkungen:

- Fragen Sie Ihr Onkologieteam nach der Verwendung von Entzündungs-/Schmerzmitteln wie Aspirin, Ibuprofen (Advil®, Motrin®) oder Naproxen (Aleve®), um Schmerzen und Steifheit zu lindern. Fragen Sie sie, wie viel Sie nehmen sollen
- Legen Sie mehrmals täglich für 15 Minuten einen Eisbeutel auf die geschwollenen Gelenke
- Halten Sie das Gelenk, wann immer Sie können, über Ihrem Herzen, um Schwellungen zu reduzieren
- Verwenden Sie Gummiband oder Klebeband auf dem Gelenk, um es zu stützen
- Vermeiden Sie Aktivitäten, die Schmerzen verursachen, aber versuchen Sie, wenn möglich, eine gewisse Trainingsroutine beizubehalten
- Wenn Sie während der Behandlung Medikamente einnehmen, benachrichtigen Sie Ihr Onkologieteam



ANDERE SYMPTOME, AUF DIE SIE ACHTEN SOLLTEN

Nachfolgend sind weitere Symptome aufgeführt, die bei der Einnahme von BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib) auftreten können. Achten Sie genau auf alle mit einem Häkchen markierten Symptome. Bitte rufen Sie das Büro an, wenn Sie eines dieser Symptome entwickeln, und erwägen Sie, direkt in die Notaufnahme zu gehen, wenn Sie eines der Warnsignale haben.

✓	Symptome	Rote Flaggen (Anzeichen dafür, dass etwas Ernstes vor sich geht, das sofortige Aufmerksamkeit erfordert)
	Veränderungen des Stuhlgangs oder Verstopfung (seltener Stuhlgang)	• Wenn Ihr Stuhl schwarz oder rot ist und Sie Schmerzen und Fieber haben
	Blutergüsse (schwarze und blaue Flecken)	—
	Schüttelfrost (Zittern) oder Kältegefühl, wenn Sie kein Fieber haben	—
	Durchfall (weicher oder häufiger Stuhlgang)	• Starke Schmerzen im Magen; Stühle, die blutig sind oder so sehen aus wie Teer
	Schwindel (Benommenheit)	• Wenn Sie ohnmächtig werden
	Müdigkeit (sich schwach oder müde fühlen)	• Wenn Sie ohnmächtig werden
	Kopfschmerzen	• Wenn Sie sehr schmerzhaft Kopfschmerzen haben (die „schlimmsten Kopfschmerzen Ihres Lebens“), Kopfschmerzen, die nicht nach ein paar Stunden verschwinden oder Kopfschmerzen mit Fieber, Nackenschmerzen oder Steifheit und/ oder Ausschlag
	Muskelschmerzen, Schmerzen, Krämpfe oder Schwäche	• Wenn diese Symptome zusammen mit dunklem, rötlichem Urin auftreten
	Übelkeit (Magenverstimmung)	• Wenn Sie unkontrollierte Übelkeit haben, die Sie aufhält durch Essen und/oder Trinken
	Reaktionen auf die Sonne (schwerer Sonnenbrand; rote, schmerzhaft, trockene, juckende Haut, die sich heiß anfühlt; Sonnenausschlag; Hautirritationen; Beulen; verdickte, trockene, faltige Haut)	• Wenn Sie Rötungen am ganzen Körper haben, Blasen auf Ihrer Haut oder in Ihrem Mund, und/oder Ihre Haut schält

✓	Symptome	Rote Flaggen (Anzeichen dafür, dass etwas Ernstes vor sich geht, das sofortige Aufmerksamkeit erfordert)
	Kurzatmigkeit (Atembeschwerden)	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie im Ruhezustand Atembeschwerden haben • Wenn Sie Kurzatmigkeit und Brustschmerzen haben und/oder Ohnmacht
	Hautentzündung (Schwellung) in bestrahlten Bereichen	—
	Magenschmerzen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie plötzliche starke Schmerzen oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Haut bei den Magen haben, Blut im Stuhl, Sie erbrechen Blut und/oder Ihre Haut oder Ihre Augen werden gelb
	Schwellungen in Armen oder Beinen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie eine warme, empfindliche Stelle an Ihrem Bein haben, die nicht schmerzt kühler wird, wenn Sie Eis darauf legen und/oder wenn die Stelle juckt oder juckt Kribbeln und/oder der Schmerz wird ohne Grund schlimmer
	Durst, mehr als sonst	<ul style="list-style-type: none"> • Sie großen Durst haben und sich sehr müde fühlen, ein Mangel an Schwitzen an einem heißen Tag, Schwäche, Schwindel, Übelkeit
	Urin, dunkel oder rötlich	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie hellrotes Blut im Urin haben. Wenn gleichzeitig Zeit, fühlen Sie sich auch schwindelig, haben Rücken- oder Seitenschmerzen, ein Metallgeschmack im Mund, Übelkeit, Erbrechen, starke Müdigkeit, Kurzatmigkeit und/oder Anschwellen von Armen, Beinen oder Gesicht
	Wasserlassen, weniger als gewöhnlich	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie auch Blut im Urin haben, Schwellungen der Knöchel, und keine Lust auf Essen
	Vaginale Blutungen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie viele Stunden lang oder stark bluten (mehr als eine Binde pro Stunde) und starke Bauchschmerzen haben
	Erbrechen (Erbrechen)	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie länger als 24 Stunden nicht halten können Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten herunterschlucken und/oder Blut erbrechen oder haben starke Bauchschmerzen
	Erbrechen (Erbrechen) mit von Blut	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie Blut erbrechen
	Die Schwäche	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Schwäche im Gesicht oder auf einer Körperseite plus Ihnen auftritt Taubheit, undeutliche Sprache, Verwirrtheit, Einschlafen haben an das Gesicht • Wenn der ganze Körper schwach ist und Sie sich sehr müde und müde fühlen sogar ohnmächtig werden, Fieber haben oder Ihr Herz rast

TAFINLAR + MEKINIST Dosierungskalender

ANFANGSDATUM: _____

Woche 1	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____
	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST
	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST
Woche 2	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____
	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST
	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST
Woche 3	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____
	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST
	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST
Woche 4	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____	Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____ Datum: _____ Tag _____
	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST
	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST	<input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST

Was passiert, wenn ich eine Dosis Tafinlar oder Mekinist vergesse? Nehmen Sie die vergessene Dosis ein, sobald Sie sich daran erinnern, es sei denn:
 ~ Sie haben Tafinlar ausgelassen und es sind weniger als 6 Stunden bis zu Ihrer nächsten Dosis. Wenn dies der Fall ist, ÜBERSPRINGEN Sie die vergessene Dosis und setzen Sie Ihre nächste Dosis zur regulären Zeit fort. Nehmen Sie NICHT die doppelte Dosis ein, um eine vergessene Dosis auszugleichen.
 ~ Sie haben Mekinist ausgelassen und es sind weniger als 12 Stunden bis zu Ihrer nächsten Dosis. Wenn dies der Fall ist, ÜBERSPRINGEN Sie die vergessene Dosis und setzen Sie Ihre nächste Dosis zur regulären Zeit fort. Nehmen Sie NICHT die doppelte Dosis ein, um eine vergessene Dosis auszugleichen.
 Weitere Verschreibungs- und Symptominformationen zu Tafinlar® (Dabrafen): https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tafinlar-epar-product-information_en.pdf
 Weitere Verschreibungs- und Symptominformationen zu Mekinist® (Trametinib): https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/mekinist-epar-product-information_en.pdf

