

IL TUO TAFINLAR® (DABRAFENIB)/MEKINIST® (TRAMETINIB) PIANO D'AZIONE

(da compilare da un membro del tuo team di oncologia)

Nome paziente _____ *Nome e cognome* Data _____ *Data odierna*

Effetti collaterali discussi _____

Punti chiave _____

COME PRENDERE IL TUO FARMACO:

- Tafinlar va assunto per via orale, due volte al giorno, a distanza di circa 12 ore. La tua dose è _____
- Mekinist si assume anche per via orale, ma solo una volta al giorno. La tua dose è _____
- Mekinist dovrebbe essere preso ogni giorno alla stessa ora, preferibilmente con entrambe le dosi mattutina o serale di Tafinlar
- Entrambi i farmaci devono essere assunti almeno 1 ora prima di un pasto o 2 ore dopo un pasto
- Mekinist deve essere conservato in frigorifero (o in un pranzo al sacco refrigerato o in una busta refrigerata se sei in viaggio) nel flacone originale con il coperchio ben chiuso a protezione il farmaco teme calore, luce e umidità. Chiedi al tuo oncologo cosa fare se dimentichi di mantenere freddo il Mekinist.

COSE FARE SE SI PERDE UNA DOSE:

- Se dimentichi di prendere la dose di Tafinlar e mancano meno 6 ore alla tua prossima dose, **NON PRENDERE** la pillola dimenticata. Se mancava più di 6 ore alla dose successiva, prendi la dose
- Se dimentichi di prendere la dose di Mekinist e mancano meno 12 ore alla prossima dose, **NON PRENDERE** la pillola dimenticata. Se mancava più di 12 ore alla dose successiva, prendi la dose.

Modi che possono aiutarti a ricordare di prendere le pillole: puoi utilizzare il calendario allegato, controllando ogni dose che prendi. Puoi anche utilizzare un allarme per smartphone o inserire promemoria su specchietti, porte o laptop. Puoi decidere cosa funziona meglio per te.

Assicurati di portare il tuo calendario alle tue visite con il tuo team di oncologia.

Se tu o il tuo partner rimanete incinta: informate immediatamente il vostro team di oncologia se voi o il vostro partner rimanete incinta o pensate di essere incinta mentre assumete questi farmaci poiché possono danneggiare un feto in via di sviluppo. Assicuratevi di utilizzare un contraccettivo efficace se sei una donna in età fertile o un uomo sessualmente attivo.

Effetti collaterali comuni di questa terapia combinata: Anche gli effetti collaterali minori potrebbero essere gravi e dovresti segnalarli TUTTI AL tuo oncologo. Gli effetti collaterali più comuni dell'assunzione di Tafinlar/Mekinist sono...

- Eruzione cutanea
- Febbre
- Brividi
- Nausea
- Diarrea
- Vomito
- Sangue alta pressione
- Gonfiore del viso, braccia o gambe
- Mal di testa
- Tosse
- Dolori articolari
- Ispessimento della pelle
- Verruche
- Perdita di capelli

PRENDERE IL FARMACO

TAFINLAR® (dabrafenib)/MEKINIST® (trametinib)

Combinazione per il melanoma

SEGNALA EVENTUALI CAMBIAMENTI DI COME TI SENTI ALL'UFFICIO DEL TUO ONCOLOGO:

Smetti di prendere i tuoi farmaci e chiedi immediatamente assistenza medica se hai uno qualsiasi di questi segni di una grave reazione allergica:

- Un'eruzione cutanea o arrossamento su tutto il corpo
- Problemi di respirazione o di deglutizione
- Gonfiore del viso, delle labbra o della lingua
- Mal di gola o voce roca
- Sensazione di svenimento
- Un battito cardiaco veloce

Potresti voler tenere un taccuino come diario del trattamento e annotare quando prendi le pillole, quante pillole prendi e se hai effetti collaterali.

Assicurati di portare questo diario alle tue visite con il tuo team di oncologia.

EFFETTI COLLATERALI IMPORTANTI:

Il tuo team di oncologia potrebbe discutere alcuni effetti collaterali di BRAFTOVI/MEKTOVI che possono portare a gravi problemi se non vengono curati immediatamente. Queste sezioni forniscono informazioni sui possibili sintomi, cosa dovresti dire al tuo team di oncologia, quando dovresti ricevere assistenza medica urgentemente e tutto quello che puoi o devi fare per alleviare i sintomi.



FEBBRE, CON O SENZA BRIVIDI

TAFINLAR[®] (dabrafenib)/MEKINIST[®] (trametinib)

Combinazione per il melanoma

Segnala immediatamente al tuo oncologo

Quali sono i sintomi?

Temperatura di ____ °C per o superiore o brividi senza febbre.

Cosa dovresti dire al tuo team di oncologia:

- Qual è la lettura della temperatura
- Quando è iniziata la febbre e quanto tempo è durata
- Che tipo di termometro hai usato per misurare la tua temperatura.
- Se hai brividi, problemi allo stomaco o respiratori, senti le vertigini quando ti alzi velocemente, ti senti molto stanco e/o non sei andato in bagno (urinando) tanto quanto di solito
- Quanto e cosa hai bevuto nelle ultime 24 ore
- Se sei stato di recente con persone affette da raffreddore/influenza o animali, o se hai viaggiato a livello nazionale o internazionale.

CAMPANELLI D'ALLARME

Chiama subito il tuo oncologo – SE NESSUNO E' DISPONIBILE, vai direttamente al Pronto Soccorso:

- Una febbre superiore a 40 °C
- Qualsiasi febbre e svenimento o sensazione di svenimento.



Gestire i tuoi effetti collaterali:

- Se approvato dal tuo oncologo, prendi antidolorifici da banco come paracetamolo o ibuprofene ogni 6 ore fino alla scomparsa della febbre. Non assumere più di 3000 mg al giorno di paracetamolo o 2400 mg al giorno di ibuprofene
- Fai un bagno fresco o tpeido
- Metti impacchi freddi sulla fronte e sul collo
- Bevi molta acqua e altri liquidi come succhi e bevande sportive o succhia ghiaccioli per prevenire la disidratazione.



CAMBIAMENTI DELLA PELLE

TAFINLAR® (dabrafenib)/MEKINIST® (trametinib)

Combinazione per il melanoma

Segnala immediatamente al tuo oncologo

Quali sono i sintomi?

- Protuberanze rossastre che sanguinano o non guariscono
- Cambiamenti nella dimensione o nel colore dei nei
- Macchie di pelle spesse/dure (come un callo)
- Prurito
- Un'eruzione cutanea
- Nuove verruche
- Una piaga della pelle

Cosa dovresti dire al tuo team di oncologia:

- Quando hai notato per la prima volta il cambiamento o il prurito della pelle
- Che aspetto ha l'"eruzione cutanea" - (p. es., piatta, irregolare, simile all'acne, ecc.)
- Dove e quanta parte del tuo corpo copre l'eruzione cutanea
- Se il cambiamento della pelle ti rende difficile vestirti, mangiare o dormire
- Se hai avuto problemi di pelle in passato e se questi sintomi sono peggiorati
- Se hai usato un nuovo sapone o sei stato recentemente in contatto con nuovi prodotti chimici o animali
- Se hai nuove piaghe cutanee, nuove verruche, protuberanze rossastre che sanguinano/non guariscono o un neo che è cambiato
- Se hai iniziato di recente ad assumere nuovi farmaci
- Qualsiasi cosa tu abbia provato a casa per gestire i sintomi.

CAMPANELLI D'ALLARME

Chiama subito il tuo oncologo – SE NESSUNO E' DISPONIBILE, vai direttamente al Pronto Soccorso:

- Se hai un'eruzione cutanea che copre gran parte del tuo corpo che sta peggiorando rapidamente
- Eventuali vesciche (sulla pelle o in bocca) che si stanno staccando. Pelle che sembra infetta (striature rosse, pus o drenante)
- Qualsiasi eruzione cutanea accompagnata da febbre (come definito dall'ufficio del tuo oncologico)



Gestire i tuoi effetti collaterali:

- Evita il sapone. Utilizzar invece detergenti delicati e non saponosi
- Evitare bagni o docce calde; usare acqua tiepida per fare il bagno
- Evita vestiti e scarpe attillati
- Tieni le unghie corte per evitare di romperti la pelle con un graffio
- Applica una crema idratante ogni giorno
- Proteggi la tua pelle dal sole indossando una crema solare (30 SPF o superiore), un cappello e indumenti protettivi dai raggi UV e occhiali da sole. Non dimenticare le mani e il viso
- Il tuo team di oncologia potrebbe dirti di assumere un antistaminico o un analgesico per ridurre il dolore e il prurito
- Sottoponiti a regolari esami della pelle prima e durante il trattamento.

PROBLEMI DEGLI OCCHI E DELLA VISIONE

TAFINLAR® (dabrafenib)/MEKINIST® (trametinib)

Combinazione per il melanoma

Segnala immediatamente al tuo oncologo

Quali sono i sintomi?

- Dolore oculare, gonfiore, o arrossamento
- Visione offuscata
- Perdita parziale o totale della vista
- Vedere aloni o altri problemi di vista

Cosa dovresti dire al tuo team di oncologia:

- Quando hai iniziato ad avere problemi di vista, quanto sono gravi e quanto tempo sono durati
- Se hai avuto problemi di vista in passato, come secchezza oculare o glaucoma
- Se di recente hai subito una lesione agli occhi, hai iniziato a prendere un nuovo farmaco o sei stato esposto a sostanze chimiche
- Se indossi lenti a contatto
- Se hai il diabete
- Se hai altri sintomi, come mal di testa, vomito o nausea.
- Quando hai fatto l'ultima visita oculistica.

CAMPANELLI D'ALLARME

Chiama subito il tuo oncologo – SE NESSUNO E' DISPONIBILE, vai direttamente al Pronto Soccorso:

- Sintomi improvvisi e gravi, come cambiamenti repentini della vista, dolore agli occhi, arrossamento o sensibilità insolita alla luce solare e all'abbagliamento
- Incapacità di svolgere le normali attività della vita quotidiana a causa di problemi agli occhi
- Perdita della vista graduale o improvvisa



Gestire i tuoi effetti collaterali:

- Segui le istruzioni del tuo team di oncologia per organizzare una visita dall'oculista.
- Indossa occhiali da sole per proteggere gli occhi dai raggi dannosi del sole.
- Se indossi lenti a contatto, fai attenzione a seguire le linee guida per mantenere gli occhi ben idratati e per pulire, bagnare e sostituire le lenti.
- Se hai il diabete, tieni sotto controllo il livello di glucosio nel sangue per ridurre il rischio di malattie agli occhi.
- Segui uno stile di vita sano per prenderti cura dei tuoi occhi e del tuo corpo
- Se si assumono farmaci durante il trattamento, avvisare il team di oncologia.



PROBLEMI DI CUORE

TAFINLAR® (dabrafenib)/MEKINIST® (trametinib)

Combinazione per il melanoma

Segnala immediatamente al tuo oncologo

Quali sono i sintomi?

- Sentendo che il tuo cuore sta saltando un battito, svolazzando o battendo troppo forte o troppo velocemente
- Sentirsi “senza fiato” o senza fiato quando si riposa o quando si è attivi
- Un cambiamento in una tosse o respiro sibilante preesistente (emettendo un fischio durante la respirazione)
- Gonfiore alle braccia o alle gambe (comprese le caviglie)
- Cambiamenti nel livello di energia
- Sudorazione eccessiva
- Vertigini
- Svenimento
- Dolore al petto

Cosa dovresti dire al tuo team di oncologia:

- Quando hai iniziato ad avere uno di questi sintomi, quanto sono gravi e quanto tempo sono durati
- Se ha avuto uno qualsiasi di questi sintomi prima di iniziare Tafinlar/Mekinist
- Se in passato ti è stato detto che soffri di disturbi cardiaci
- Ciò che allevia o peggiora i sintomi
- Se hai recentemente aggiunto nuovi farmaci prescritti o da banco
- Se hai già fatto una radioterapia

CAMPANELLI D'ALLARME

Chiama subito il tuo oncologo – SE NESSUNO E' DISPONIBILE, vai direttamente al Pronto Soccorso:

- Inizio improvviso di questi sintomi
- Qualsiasi dolore al petto
- Respirazione difficoltosa
- Svenimento
- Incapacità di svolgere le attività tipiche della vita quotidiana a causa dei sintomi



Gestire i tuoi effetti collaterali:

- Segui le istruzioni del tuo team di oncologia per fare un esame del cuore
- Assicurati di bere abbastanza liquidi per rimanere idratato
- Evita di bere alcolici o di assumere droghe che agiscono su cuore o cervello (come marijuana, sonniferi o stimolanti) a meno che non ti venga detto dal tuo medico
- Segui uno stile di vita sano per prenderti cura del tuo cuore e del tuo corpo
- Se stai assumendo farmaci per la pressione sanguigna o per il cuore, assicurati di prenderli come ordinato e non perdere nessuna dose.



DOLORE ALLE ARTICOLAZIONI, GONFIORE O RIGIDITÀ

TAFINLAR® (dabrafenib)/MEKINIST® (trametinib)

Combinazione per il melanoma

Segnala immediatamente al tuo oncologo

Quali sono i sintomi?

- Dolore articolare
- Rigidità articolare
- Difficoltà a camminare o svolgere le attività quotidiane
- Gonfiore articolare
- Arrossamento intorno a un'articolazione

Cosa dovresti dire al tuo team di oncologia:

- Quando sono iniziati questi sintomi, cosa li causa e quanto tempo sono durati
- Quali articolazioni sono interessate
- Se ha mai avuto problemi alle articolazioni in passato e se i tuoi sintomi sono peggiorati
- Qualsiasi cosa tu abbia provato a casa per gestire i sintomi.

CAMPANELLI D'ALLARME

**Chiama subito il tuo oncologo –
SE NESSUNO E' DISPONIBILE, vai
direttamente al Pronto Soccorso:**

- Insorgenza improvvisa o grave di dolore articolare, gonfiore o rigidità
- Se l'articolazione appare deformata
- Se non puoi appoggiare il peso sull'articolazione (come la caviglia) o usarla affatto



Gestire i tuoi effetti collaterali:

- Con l'approvazione del tuo oncologo, prendi antinfiammatori/antidolorifici come aspirina, ibuprofene, o naprossene per alleviare il dolore e la rigidità. Chiedi al tuo team di oncologia che dose prendere
- Applica un impacco di ghiaccio sulle articolazioni gonfie per 15 minuti più volte al giorno
- Tieni l'articolazione sopra il cuore ogni volta che puoi per ridurre il gonfiore
- Utilizza un involucro elastico o del nastro adesivo sull'articolazione per sostenerla
- Evita le attività che causano dolore, ma cerca di mantenere una routine di esercizi, se possibile
- Se si assumono farmaci durante il trattamento, avvisare il team di oncologia



ALTRI SINTOMI CUI PRESTARE ATTENZIONE

Di seguito sono riportati altri sintomi che potrebbero verificarsi durante l'assunzione di Tafinlar® /Mekinist®. Siamo molto preoccupati per i sintomi che abbiamo contrassegnato con un segno di spunta. Si prega DI SEGNALARE SUBITO se si sviluppa uno di questi sintomi. Chiama immediatamente IL TUO oncologo se sviluppi uno qualsiasi dei sintomi da CAMPANELLO DI ALLARME. Se NON RIESCI A PARLARE CON NESSUNO, vai al Pronto Soccorso.

✓	Sintomi	CAMPANELLI D'ALLARME (SEGNALI CHE POTREBBE ESSERE IN CORSO QUALCOSA DI GRAVE CHE RICHIEDE UN'ATTENZIONE IMMEDIATA)
	Alterazioni del movimento intestinale o costipazione (movimenti intestinali rari)	<ul style="list-style-type: none"> • Se le tue feci sono nere o rosse più hai dolore e febbre
	Lividi (segni neri e blu)	---
	Brividi (tremore) o sensazione di freddo quando non hai la febbre	---
	Diarrea (feci molli o frequenti)	<ul style="list-style-type: none"> • Forte dolore allo stomaco; feci sanguinolente
	Vertigini (vertigini)	<ul style="list-style-type: none"> • Se sveni
	Stanchezza (sentirsi debole o stanco)	<ul style="list-style-type: none"> • Se sveni
	Mal di testa	<ul style="list-style-type: none"> • Se hai un mal di testa molto doloroso (il "peggiore mal di testa della tua vita"), mal di testa che non scompare dopo poche ore, o mal di testa con febbre, dolore al collo o rigidità e/ o avventato
	Dolori muscolari, dolori, spasmi o debolezza	<ul style="list-style-type: none"> • Se questi sintomi si verificano insieme a urine scure e rossastre
	Nausea (mal di stomaco)	<ul style="list-style-type: none"> • Se hai una nausea incontrollata che ti sta trattenendo dal mangiare e/o dal bere
	Reazioni al sole (forte scottatura solare; pelle arrossata, dolorosa, secca, pruriginosa e calda al tatto; eruzione cutanea; irritazione cutanea; protuberanze; pelle ispessita, secca e rugosa)	<ul style="list-style-type: none"> • Se hai arrossamento su tutto il corpo, vesciche sulla pelle o in bocca e/o la pelle si desquama
	Mancanza di respiro (problemi respiratori)	<ul style="list-style-type: none"> • Se hai difficoltà a respirare mentre riposi • Se ha dispnea e dolore al petto e/o svenimento
	Infiammazione della pelle (gonfiore) nelle aree trattate con radiazioni	---

✓	Sintomi	CAMPANELLI D'ALLARME (SEGNALI CHE POTREBBE ESSERE IN CORSO QUALCOSA DI GRAVE CHE RICHIEDE UN'ATTENZIONE IMMEDIATA)
	Mal di stomaco	<ul style="list-style-type: none"> • Se si avverte un improvviso forte dolore o dolorabilità nello stomaco, sangue nelle feci, stai vomitando sangue e/o la tua pelle o gli occhi stanno diventando gialli
	Gonfiore alle braccia o alle gambe	<ul style="list-style-type: none"> • Se hai un punto caldo e tenero sulla gamba che non si raffredda quando ci metti sopra del ghiaccio e/o se il punto è pruriginoso o formicolio e/o il dolore peggiora senza motivo
	Sete, più del solito	<ul style="list-style-type: none"> • Se hai una grande sete e ti senti molto stanco, una mancanza di sudorazione in una giornata calda, debolezza, vertigini, nausea
	Urina, scura o rossastra	<ul style="list-style-type: none"> • Se hai sangue rosso vivo nelle urine. Se allo stesso tempo, hai anche vertigini, dolore alla schiena o al fianco, a sapore di metallo in bocca, sensazione di mal di stomaco, vomito, sensazione di stanchezza, respiro corto e/o gonfiore di braccia, gambe o viso
	Minzione, meno del solito	<ul style="list-style-type: none"> • Se hai anche sangue nelle urine, gonfiore alle caviglie, e non hai voglia di mangiare
	Minzione, più del solito	---
	Sanguinamento vaginale	<ul style="list-style-type: none"> • Se sanguini da molte ore o sanguini molto (più di un tampone all'ora) e hai un forte dolore allo stomaco
	Vomito	<ul style="list-style-type: none"> • Se trascorri più di 24 ore senza essere in grado di trattenere cibi o liquidi, e/o vomiti sangue o hai forte mal di stomaco
	Vomito di sangue	<ul style="list-style-type: none"> • Se vomiti del sangue
	Debolezza	<ul style="list-style-type: none"> • Se la debolezza è sul viso o su un lato del corpo più senti intorpidimento, linguaggio confuso, confusione • Se la debolezza è su tutto il corpo e ti senti molto stanco e anche svenire, se hai la febbre o il tuo cuore batte in modo diverso dal solito

RISORSE

Calendario di dosaggio TAFINLAR + MEKINIST

DATA D'INIZIO: _____

SETTIMANA 1 _____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>
SETTIMANA 2 _____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>
SETTIMANA 3 _____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>
SETTIMANA 4 _____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>	_____ giorno Data: _____ ☀ TAFINLAR <input type="checkbox"/> ☾ TAFINLAR <input type="checkbox"/> MEKINIST <input type="checkbox"/>

Cosa succede se dimentico una dose di Tafinlar o Mekinist? Prenda la dose dimenticata non appena se ne ricorda, a meno che:

- Hai dimenticato Tafinlar e mancano meno di 6 ore alla dose successiva. In tal caso, salti la dose dimenticata e continui la dose successiva all'orario normale. NON prenda una dose doppia per compensare quella dimenticata.
 - Hai dimenticato Mekinist e mancano meno di 12 ore alla dose successiva. In tal caso, salti la dose dimenticata e continui la dose successiva all'orario normale. NON prenda una dose doppia per compensare quella dimenticata.
- Per ulteriori informazioni sulla prescrizione e sui sintomi Tafinlar® (dabrafen): https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tafinlar-epar-product-information_en.pdf
 Per ulteriori informazioni sulla prescrizione e sui sintomi Mekinist® (trametinib): https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/mekinist-epar-product-information_en.pdf